

DERMÁPTEROS  
DE LA  
GUINEA ESPAÑOLA

POR

MALCOLM BURR

de la Sociedad Entomológica de Londres.

---

Los dermápteros recogidos por el Sr. Martínez de la Escalera, con ser poco numerosos, encierran, sin embargo, especies interesantes, siendo notable que, en tan corto número de especies, se cuenten dos nuevas; esta proporción hace esperar que esta fauna ha de ofrecer grandes sorpresas á los naturalistas si, como es de desear, continúa explorándose aquella región por viajeros inteligentes y peritos en este género de trabajos.

Gen. **Apachys** *Serville*.

**Apachys Reichardi** *Karsch*.

Gen. **Spongiphora** *Serville*.

**Spongiphora robur** sp. nov.

Statura minore, robusta; color fusco-rufus vel rufo-castaneus; antennae.....?; caput nigrum, laeve; pronotum longum, metazo-

na valde depressa, rufa; prozona tumida nigra; margine postico valde rotundato; elytra lata, glabra, laevia, fusco-castanea; alae prominentes, eodem colore; pedes fusco-castanei; abdomen eodem colore, apicem versus infuscatum; segmentis 2 & 3 plicis parvis instructis; segmentum ultimum magnum, latum, nigrum, laeve, margine postico medio sulcato-impresso, utrinque, supra insertionem forcipis, tuberculo obtuso instructo; angulis exterioribus subdilatis; pygidium parvum, vix prominens, latum, breve, superne tuberculis duobus instructum; forcipis brachia valida, basi remota, brevia, subrecta, sensim incurva, margine interiori dentibus obsolete armata ♂.

Long. corporis, 12 mm.

» forcipis, 1,25 mm.

Patria: Biafra, Cabo San Juan, VIII-1901. (Escalera).

Esta especie parece ser próxima de *S. lutea* Borm., pero se distingue por el desarrollo de las alas, por el pigidio con dos tubérculos gruesos, no pequeños, y por la fortaleza de las pinzas.

### *Spongiphora quadrimaculata* Stål.

#### Gen. *Labia* Leach.

##### *Labia quadrilobata* Borm.

Biafra, Cabo San Juan.

##### *Labia minor* L.

Biafra, Cabo San Juan.

#### Gen. *Chætospania* Karsch.

##### *Chætospania Escalerae* sp. nov.

Colore rufo-nigro, abdomine rufescenti; corpus depressum, glabrum; antennae 10 segmentatae, segmentos 2 minimo, 3 elongato, cylindrico, 4 breviori, validiori, 5 longiori, valido, ceteris sensim longioribus, conicis, colore fusco-brunneis; caput,

paene vel haud excavatum; pronotum lateribus parallelis, margine anteriore sensim angustatum, postico rotundato; elytra alaeque laevia, elongata; femora incrassata, nigra; tibiae tarsique graciles, pallidiores; abdomen depressum, tuberculis lateralibus aegre distinguendis; segmentum ultimum dorsale ♂ ♀ laeve, latum, magnum, margine postico incrassatō, tuberculis tumidis obsoletis instructum; pygidium ♂ breve conicum, apice truncatum, angulis 2 minutissimis armatum; pygidium ♀ breve, quadratum, margine postico sinuato, angulis in dentes obtusos obliquos breves productis: forcipis bracchia ♂ gracilia, recta, elongata, apice incurva, depressa, basi triquetra, margine interno ad tertiam partem longitudinis dente acuto armata; ♀ minus gracilia, basi ipso margine interno dente forti acuto armata, dehinc margine interno paullo laminato-depresso ac crentulato. ♂ ♀.

Long. corporis ♂, 17-18 mm.; ♀, 17-18 mm.

» forcipis ♂, 2 mm.; ♀, 2,5 mm.

Patria: Biafra, Cabo San Juan, VII-VIII-1901. (Escalera). (6♂♂, 7♀♀).

Esta especie tiene mucha analogía con *Ch. volcana* de Madagascar, con que hace un grupo muy natural, caracterizado por el pigidio cónico del macho. Se distingue de *Ch. volcana* por la coloración y por la forma diferente de las pinzas. Me complazco mucho en dedicarla á mi amigo y colega Sr. D. Manuel Martínez de la Escalera.

Madrid, 1.º de Mayo de 1906.